

Mụn cóc sinh dục có điều trị dứt điểm?

Bệnh sùi mào gà là chứng bệnh lây lan qua đường tình dục phổ biến nhất, do HPV- vi-rút sinh nốt sần ở người gây. Bệnh sùi mào gà được xem là một trong các bệnh gây tác động nhiều đến chất lượng đời sống và chất lượng chuyện giường chiếu của người có bệnh. Do bệnh sùi mào gà hay mắc bệnh trở lại nên nhiều người cho rằng bệnh không thể điều trị khỏi. Văn bản phần tiếp theo giúp bạn đọc biết rõ hơn về bản khoản này.



Khả năng lây lan HPV có thể diễn ra khi không có thương tích bệnh sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà lây lan qua đường tình dục phổ biến với đặc thù là các thương tích dạng nhú lành tính ở cơ quan sinh dục, bẹn, mu, trực tràng, vòng vèo trực tràng. Nên nhiều người có bệnh đến khám cho rằng dạo này không có quan hệ với người thương. Lần sau cùng phương pháp đây vài tháng có quan hệ với bạn nữ mới quen.... Vì thế chưa nắm rõ lây bệnh từ đâu.

Thế nhưng, khi bị nhiễm HPV, vi-rút cần một thời điểm ủ bệnh và làng nhàng thời kỳ ủ bệnh khoảng 1 - 12 tuần sau khi có đụng chạm ban đầu. Vi-rút xâm nhập vào niêm mạc nhạy cảm qua các thương tích nhỏ ở thượng bì và nằm ở lớp tế bào đáy. Ngoài ra, vi-rút có thể ẩn chứa, nằm ngủ trong một thời gian dài trong thân thể người có bệnh và không gây bất kể biểu hiện lâm sàng nào của bệnh sùi mào gà.

Do đó vậy, vô cùng khó xác định vì chưa nắm rõ chính xác thời điểm bị lây HPV ban đầu. Ngoài ra, người ta ghi nhận khả năng lây lan HPV cho người thương cao và có thể diễn ra ngay cả khi không có thương tích bệnh sùi mào gà. Các nhân tố tiện lợi cho bị nhiễm HPV là nhiều người thương và mắc các bệnh lây lan qua đường tình dục khác.

Trên thực tế đa số người bị nhiễm HPV không có biểu hiện lâm sàng, tỉ lệ có biểu hiện chỉ khoảng 1-2%. Thời kỳ toàn phát thương tích đặc thù là các sẩn nông, kích cỡ từ 1-10mm, có thể đơn độc hoặc nhiều. Các loại thương tích khác có thể gặp là sẩn mịn hình vòm, màu da; sẩn không khác súp lơ màu hồng hoặc màu da; sẩn tăng sừng có lớp vảy dày, tương tự nốt mào gà ở da hay dày sừng da đầu; sẩn dẹt hơi nhô lên trên chỗ da xung quanh, màu hồng, phẳng, bề mặt nhẵn.

Nhóm đấng mày râu phổ biến thương tích bệnh sùi mào gà ở "cậu bé", khe quy đầu, dây hãm "cậu bé", mặt trong bao da quy đầu, bìu; ở người phụ nữ phổ biến ở "cô bé", môi bé, môi lớn, "cô bé", miệng sáo, âm đạo và cổ dạ con. Ngoài ra, thương tích bệnh sùi mào gà có thể thấy ở bẹn, khu vực đáy chậu và trực tràng.

Mụn cóc sinh dục có điều trị dứt điểm?

Mụn cóc sinh dục là một bệnh lây lan do vi-rút do đó việc điều trị dứt điểm khỏi các thương tích bệnh sùi mào gà nhưng mà không bài tiết được vi-rút hoàn toàn. Nhất là một số thương tích nhỏ, nằm sâu phía trong niêm mạc bị nhiễm nhưng mà chưa phát triển thành sùi... sẽ khiến tái phát - có nghĩa người có bệnh vẫn có thể tái phát bệnh sau khi quá trình điều trị hoàn tất.

Nhờ đó, cảnh báo của các y bác sỹ cho người có bệnh mắc bệnh sùi mào gà là cần khám lại để ý sau điều trị. Mỗi 2 tuần sau can thiệp phải cần khám lại để nhận biết thương tích bệnh sùi mào gà mới, nếu như sau 12 tuần liên tục khám lại người có bệnh không trông thấy thương tích mới được xem là khỏi hẳn bệnh hoàn toàn.

Điều trị bệnh sùi mào gà bằng phương pháp nào hữu hiệu nhất

Mục đích điều trị bệnh sùi mào gà là bài tiết thương tích, không phải là phá hủy vi-rút nên việc lựa chọn phương pháp điều trị cần dựa vào tuổi người có bệnh, vị trí, số lượng, kích cỡ thương tích, giá tiền và khả năng chuyên môn cũng như trang thiết bị máy móc của địa điểm điều trị.

Vậy nên, không thể nói có phương pháp nào điều trị bệnh sùi mào gà được xem là nổi bật và phù hợp cho hầu hết các người có bệnh cũng như hầu hết các thương tích. Các phương pháp điều trị không diệt được vi-rút HPV, thời điểm bài tiết vi-rút ra ngoài cơ thể chưa nghe nói rõ. Mắc bệnh trở lại có thể diễn ra ở hầu hết các phương pháp điều trị vi-rút.

Đa số việc điều trị bệnh sùi mào gà đều ngoại trú, riêng với một số trường hợp nhất là như: người có nguy cơ tai biến, người phụ nữ mang bầu, thương tích lớn hoặc số lượng nhiều các bác sỹ sẽ chỉ định điều trị nội trú khi cần để ý trước và sau điều trị.

Các phương pháp có thể được chỉ định gồm có:

- Sử dụng thuốc thoa imiquimod, podophyllotoxin. Cho dù việc điều trị đạt được hữu hiệu cao nhưng mà người có bệnh cần thoa thuốc kéo dài và cẩn trọng để phòng các phản ứng phụ tại chỗ và toàn thân có thể diễn ra khi sử dụng thuốc.
- Dùng liệu pháp quang động học, laser CO2, plasma, đốt điện... phá hủy thương tích bệnh sùi mào gà. Một số phương pháp này có công dụng bài tiết đa số thương tích trong một lần khoảng 89-100%. Nhưng mà người có bệnh cần nhiều lần điều trị mới đạt được sự lui bệnh lâu dài.
- Sử dụng thuốc điều chỉnh miễn dịch
- [Chi phí xét nghiệm sùi mào gà](#) giá bao nhiêu?

Ngoài ra, các bác sỹ có thể dùng hợp nhất các phương pháp để điều trị bệnh sùi mào gà. Riêng thành phần nhất là như: người phụ nữ mang bầu, người có bệnh bị nhiễm HIV và các thành phần suy nhược miễn dịch khác sẽ có một số chỉ định cẩn trọng và việc điều trị cụ thể cho từng tình huống.

Vậy nên, khi có biểu hiện bệnh sùi mào gà người có bệnh yêu cầu cơ sở y tế khám điều trị bệnh uy tín, chất lượng, đầy đủ cơ sở hạ tầng để lựa chọn được phương pháp điều trị phù hợp cũng như được điều trị đúng, hữu hiệu. Đừng nên vì cảm xúc bất an, ngập ngừng mà tìm đến các địa điểm không

đảm bảo hoặc tự điều trị, điều trị theo mạch bảo mà dẫn đến hậu quả lâu dài.